

益元蠲痛膏治疗骨关节痛

内蒙伊盟中医院 (017000) 张根源 田玉超

益元蠲痛膏是由《疡医大全》所载“火龙膏”化裁而制成的外用膏药。笔者从1991年2月至1991年6月用此膏治疗骨关节痛症40例,效果较为满意,现介绍如下。

一般资料

本组40例中男24例,女16例;年龄最大67岁,最小12岁;骨性关节炎11例,骨关节周围软组织损伤10例,颈椎综合征5例,肱骨外上髁炎4例,肩周炎3例,狭窄性腱鞘炎3例,跟痛症3例,颞下颌关节炎1例。

治疗方法

方药组成及制备:闹羊花、洋金花、乳香、没药、血竭、牡蛎、海藻、甘草、蓖麻子、白芥子、急性子、威灵仙、白芷、南星、樟脑、麝香,共研细粉。加生姜汁、陈醋、凡士林适量调制成软膏。使用时取膏药适量,置胶布上外敷患处、固定。敷药厚度0.5cm,大小随病变范围而定,一般应超过病变区1cm。二日换药一次,四次为一疗程。

治疗结果

痊愈21例,显效9例,好转8例,无效2例,总有效率95%。无效2例中,1例为颈椎综合征,1例为腰椎骨性关节炎并腰5骶化。全部病

例中未发现较严重的不良反应和副作用。仅1例用药后局部皮肤出现湿疹,停药后很快消失。

典型病例

杜×、女性、40岁、本院内科大夫。左腕疼痛一周余,活动受限。查:左桡骨茎突处轻微隆起,压痛(+);握拳尺偏试验(+);X线片示:左腕骨质未见明显异常改变。诊断:左桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。予本品外敷,次日疼痛消失,功能恢复正常,随访无复发。

体会

“火龙膏”原方系由乳香、没药、麝香、生姜汁、牛皮胶五味药组成。用于治疗筋挛骨痛,或肢节烦痛,湿痰流注作痛,不能步行;及鹤膝风、历节风疼痛等。笔者进行化裁,制成之益元蠲痛膏,较原方取效更捷。可广泛用于筋膜、滑囊的急慢性损伤,或骨关节的退行性变所致的各类痛症。

全方活血化瘀,行气消痰,软坚散结、通络止痛。

对狭窄性腱鞘炎,网球肘的疗效尤为显著。另外膏中所用陈醋,生姜汁不单纯起粘合作用,不可轻弃,否则影响药力。

(上接第31页)

参 考 文 献

- (1) 方彰林. 七厘散外敷引起过敏性皮炎 两例. 辽宁中医杂志. 1982. 6(2):12.
- (2) 卢生云. 三七片引起药疹1例报告. 皮肤病防治研究通报. 1979. (4):227.
- (3) 王茂光等. 云南白药中毒一例报告. 四川中医. 1984. 2(1):49.
- (4) 汪正家. 云南白药引起房室传导阻滞一例. 浙江中医药. 1979. (1):11
- (5) 焦文举等. 口服云南白药引起急性肾功能衰竭1例报告. 中医学报. 1980. (4):4.
- (6) 杨金各. 服云南白药方法不当引起急性咽喉炎 一例报告. 云南中医杂志. 1985. 6(4):51.
- (7) 张洪扬等. 临床所见的中药毒副反应. 江西中医药.

1987. 18(4):55~57.
- (8) 常国芳. 跌打丸过敏一例报告. 山西中医. 1985. 1(2):38.
- (9) 朱天忠. 常用中成药的不良反应及预防. 药学通报. 1986. 21(1):42~44
- (10) 常敏毅. 中药方剂引起的不良反应. 药学通报. 1984. 19(7):56.
- (11) 张学安. 舒筋活血丸严重中毒一例. 新医学. 1985. 16(3):146.
- (12) 宋梅生. 小活络片引起荨麻疹样药疹1例. 新医学. 1981. 12(7):36
- (13) 王锡福. 镇江膏中毒一例报告. 山东中医杂志. 1986. (1):15.
- (14) 侯玉芬. 丹参注射液静脉滴注休克2例报告. 山东中医杂志. 1986. (1):22.