

祛瘀消肿糖浆治疗外伤性血肿

江苏省高邮市中医院(225600) 石庆培

祛瘀消肿糖浆是根据我省已故名中医许钜材先生祖传经验方祛瘀消肿汤改制而成。具有散瘀消肿定痛之功。我科自 1993 年 3 月~1995 年 3 月应用该药治疗外伤性血肿 400 例,并与市售同类药活血丸治疗的 100 例进行对照观察,现报告如下。

临床资料

临床观察 500 例(实验组 400 例,对照组 100 例),将患者随机分为 2 组,分别口服祛瘀消肿糖浆和活血丸。实验组:年龄 5~29 岁;致伤原因:骨折 24 例,关节脱位 175 例,各种软组织损伤 201 例;肿胀面积:9~1520cm²;治疗时间:2~11 天。对照组:年龄 6~77 岁;致伤原因:骨折 7 例,关节脱位 25 例,各种软组织损伤 68 例;肿胀面积:7~940cm²;治疗时间:4~13 天。

治疗方法

1. 实验组药物:祛瘀消肿糖浆。药用参三七、降真香、生地各 15g、丹参 30g、红花、当归、炙乳没、泽兰各 12g、川芎、香附、炙白术各 10g。制法:将降真香等 11 味煎煮 2 次,第 1 次沸腾 1.5 小时,第 2 次沸腾半小时,合并,过滤,浓缩到 200ml;将研成粉末状的参三七冲入药汁内;再加入苯甲酸钠 0.75g,白砂糖 150g,溶化,调至 250ml,装瓶备用。服法:成人每次服 50ml,早晚各 1 次,儿童酌减,7 天为一个疗程。适应症:凡病程在 2 周以内的头面、胸腹、四肢软组织急性损伤或骨折、脱位复位后,局部皮肤灼热、青紫瘀斑、肿胀疼痛者,均可服用。若病程已超半月,脾胃虚寒,腹满便溏者不宜,孕妇忌用。2. 对照组药物:活血丸(南京同仁堂制药厂生产,苏卫药准字 821387-1 号)。本品具有活血消肿止痛作用,适用于跌打损伤、瘀血肿痛等症。每服 6~9g,1 日 2

次。观察期间均停用其他一切药物。

治疗结果

疗效标准:血肿全部消退,疼痛消失者为痊愈;血肿大部分消退,略感疼痛者为显效;血肿与疼痛均逐渐减轻者为有效;症状和体征未改变者为无效。依照上述疗效标准,于用药一个疗程后评定疗效,其结果:实验组:治愈 302 例,显效 62 例,有效 31 例,无效 5 例。总有效率为 98.75%。对照组:治愈 28 例,显效 30 例,有效 24 例,无效 18 例。总有效率为 82%。两组疗效有显著性差异($P < 0.01$)。

体会

祛瘀消肿糖浆治疗外伤性血肿疗效显著,方中选用“止血不留瘀”的参三七为主药,降真香止血活血,生地清热凉血,二味协同参三七止血以断血肿之源。根据“结者散之”的原则,离经之血必须消散,故用红花、当归、炙乳没、丹参、泽兰活血化瘀,消肿定痛。其中丹参凉血消痛,以防瘀肿化热为脓;泽兰行瘀下行,利尿消肿。气为血帅、气行则血行,故用香附助川芎行血中之气。白术性温补脾益气,燥湿利水退肿,使全方攻中有补,并防寒凉太过,损伤正气。诸药合用,确具凉血止血,行气散瘀、消肿定痛之功。

祛瘀消肿糖浆适用于外伤性血肿早期或早期病程在半月以内者,用之得法,其响立应。体现了中医外病内治局部与全身统一的整体观念,尤其适用于皮肤破溃,开放骨折等不能局部用药者。在观察本组病例中,未发现毒付作用。加之药物剂型的改变,药味微苦偏甜,方便了病人服药,儿童患者也可接受。

(收稿:1996-03-21)

安徽省高校科技函授总部中医函授面向全国招生

省教委办学许可证 0192005 号

为给广大中医爱好者开辟自学成长、自谋职业之路,以解决晋升、开业和应聘的需要,本专业继续面向全国常年招生。本部建校十年,已有丰富的教学经验和完善的师资队伍。开设十二门中西医结合课程,各科均由专家教授全面辅导教学。选用《全国高等中医学院函授教材》,与高等教育中医自学考试紧密配合,确保大专水平。凡初中以上文化程度者均可报名,汇款 5 元至“236000 安徽阜阳高函办公室”即寄简章。电话:0558-2318260。