

# 小儿肘关节的损伤中药按摩治疗

山西省侯马市人民医院

黄新民

刘德军

我科自一九八〇年以来，收治小儿肘关节损伤74例。通过正复按摩中药综合治疗，取得了明显疗效。现介绍如下：

## 一、一般资料：

1. 本组74例，其中男性47例，女性27例。患病最长4天，最短1天。

2. 年龄分布：3—7岁41例，7—12岁28例，12—15岁15例。

### 3. 损伤类型：

(1) 肱骨髁上骨折合并肱骨远端骨骺滑脱。

(2) 肘关节损伤后软组织粘连，功能失调。

### 4. 疗效：

治疗：肘关节无畸形，软组织功能恢复，伸屈正常。

显效：肘关节无畸形，软组织功能好转，伸屈尚受阻有痛感。

好转：肘关节略畸形，软组织功能恢复差，伸屈受阻。

## 二、诊治方法：

本组病例，通过X光片确诊后，即行手法整复石膏或夹板外固定。外固定拆除后，再以按摩配合本科自拟经验中药口服及熏洗治疗。

### 具体步骤：

#### 1. 临床症状及诊断：

患儿大多有外伤史，患肢肘关节处于半屈位，关节肿胀，伸屈明显受限，前臂旋转略受限，压痛点以肱骨髁上为甚，肘后三角关系较正常。

#### X光显示：

正位：肘关节骨性关系正常。

侧位：肱骨髁上有裂纹骨折合并肱骨远端骨骺滑脱。

划线显示：桡骨小头正中线不通过肱骨小头中心。

#### 2. 整复手法治疗：

患儿让家长抱坐于凳子上，术者坐于对面，左手放于肘关节后缘，右手握患儿腕部，使肘关节屈曲90°后，用力对向挤压，同时极度屈曲肘关节，此时可感觉有骨性滑动感，然后在手牵引下伸直肘关节，被动桡偏，术毕。术后屈肘90°位石膏固定，12天—20天。拆除外固定，肘关节处以屈肘位，局部软组织血液循环不良，肌腱挛缩，肘关节伸屈旋转明显受限，再配合按摩及本科自拟经验中药方口服熏洗治疗。

#### 3. 按摩：

手法：以推、拿、揉、手牵引为主。点、抖为辅。

穴位：曲池、尺泽、手三里、合谷、孔最、巨骨、肩髃等。

操作方法：轻推、轻揉肘关节局部10分钟，轻拿上下远端5分钟，然后双手对抗牵引3—5下，每次反复操作两遍，最后以点穴，抖肢端结束。

#### 4. 中药（自拟舒筋活血汤）：

归尾6、赤芍6、二花5、防风5、白芷5、花粉3、乳香3、没药3、川甲珠3、陈皮3、浙贝母3、生草3、灵仙5。

皂刺为引，水煎服，每日一剂分服。

此方系用3—10岁小儿，连服5剂即愈。

归尾9、赤芍9、防风12、白芷7、五加皮7、川椒7、祁艾6、苦参12、荆芥12、白蒺藜12、灵仙6、川牛膝6、牙皂9、生草6、红花3。水煎洗，连用三剂，每二日洗一剂。

#### 5. 综述以上治疗方法：

总有效率达到100%，

治愈率达到90%。

## 三、小结：

肱骨下端扁而宽，前有冠状窝，后有鹰嘴窝，两窝之间仅有一层极薄的骨片，肱骨髁上又为松质骨及坚质骨的交接处，所以髁上部位容易发生骨折，但此处血运较丰富，在治疗过程中，只要处理得当，也较好愈合。手法治疗骨骺滑脱是采用物理杠杆原理，被动屈肘关节，腕关节为力点，肱骨髁上为起点，尺骨喙突为支点，被动挤压肱骨远端骨骺，迫使骨骺还原。肘关节骨质骨骺经整复加外固定愈合后，局部由于长期血运不良，软组织形成粘连肌腱挛缩，伸屈功能失调，用按摩手法配合本科自拟的“活血化淤、舒筋通络，消肿止痛、消除筋挛”经验中药汤剂口服和熏洗，能促使局部血液循环加快疏通，使挛缩软化，肘关节功能恢复，取得了较理想而满意的效果。以上是我科几年来初试的探讨治疗，还有不妥之处，敬请同道们予以教正。