

## 加味如意金黄散外敷治疗骨折及软组织损伤

山东荣成市中医院 (264300) 林治琳

笔者运用“加味如意金黄散”外敷，治疗早期闭合骨折及软组织损伤病人46例，取得了止痛作用好、肿胀消退快的疗效，报告如下。

### 临床资料

本组46例病人，男性35例，女性11例；年龄最小者1岁，最大者60岁；伤后至入院时间最短者1小时，最长者12天；闭合骨折31例，膝及踝关节侧副韧带损伤15例，其中1例左踝关节内侧副韧带损伤并后踝骨折。

### 药物组成及使用方法

组成：天花粉10、黄柏5、姜黄5、生大黄5、白芷5、紫厚朴2、陈皮2、苍术2、南星2、冰片1。

制法：按上方组成及比例，共研细末过筛，装密封瓶内备用。

用法：取上药末适量，加蜂蜜调成糊状，摊于纱布上，厚约2mm环形包敷于损伤四周。骨折于手法复位后敷药，同时小夹板外固定，侧副韧带损伤敷药后以相应的石膏外固定，每隔24小时双人换药一次，检查局部情况，并要求病人外固定后主动做允许的功能活动。

### 治疗结果

敷药后疼痛消除时间：最短者2小时，最

长者72小时，平均24小时；肿胀消退时间：最短者36小时，最长者7天，平均3天。

### 讨论及体会

骨伤早期患者因伤痛的刺激及耽误工作，致心肝之火内燃，还有平时多嗜烟酒之人湿热素盛，大多表现为心烦、口干、小便黄、大便干、舌质红、脉数，伤处手触之有灼热感，上述症状体征中医辨证属热盛。而受伤肢体有发胀、沉重感，肢体肿胀，起张力水泡、关节积血、积液、开放伤口渗液等均属有湿之象。因而湿热亦是骨伤初期一个重要病机，骨伤初期不应单从血论，活血化瘀配合清热利湿可提早消肿止痛，有利于肢体功能的恢复，减少后遗症。

如意金黄散方出于《外科正宗》，原方主治痈疽、发背、诸般疔肿、跌打损伤，……。笔者用如意金黄散原方加冰片，系取冰片清热止痛的功。方用白芷、陈皮、厚朴、苍术、南星、黄柏利湿化痰理气通滞；天花粉、生大黄、冰片、姜黄清热凉血化瘀止痛；用蜂蜜取其粘性及止痛解毒保护皮肤的作用。本方临床运用止痛效果好，肿胀消退快，无不良反应，且药源丰富，价格低廉，值得推广使用。

## 新生儿助产过程失误性骨折5例报告

河南省汝阳县人民医院 (471200) 袁成俊 尹兰香 袁敏姣

一般资料：男3、女2，发现骨折产后3~9天；均为足月妊娠，头先露1例，臀位3例，横位一例；体重3600g~4700g；骨折部位分布，左股骨中段斜面折2例，右股骨上段1例，右肱骨中段柳折并锁骨骨折一例，左肱骨中段骨折1例；产程情况：轻度青紫窒息2例，经过清理呼吸道、哭声好，中度青紫窒息2例、经清理呼吸

道、吸出羊水行人工呼吸、强心、兴奋呼吸道药物应用、给O<sub>2</sub>等综合抢救，有哭声、逐渐好转。1例正常。

一般临床症状和治疗：本组病例，均为更衣换尿布时发现哭闹不休，并能查及骨折处肿胀，有触及痛、畸形、骨擦音。经X线拍片均证实有骨折，其中2例有少量骨痂生成，均行