

多孔套中珠状物渐进松动，显示了假体的不稳定性。

股骨部分

初期的稳定性是骨向臼内生长并与植入物融合的前提，即仅仅允许极其微小的运动。力学研究表明，非骨水泥股骨假体的种种细微运动比骨水泥股骨假体更大。伦琴立体摄影图检查显示几乎所有非骨水泥股骨假体的相当大的初期移位可以解释为假体不稳定的结果。股内侧照相显示，手术后2年或更多的时间里70—100%非骨水泥股骨假体的骨干端具有活动力而骨水泥股骨假体有此活动力的只有10—20%。

据报导，在一些股骨假体多孔套内的珠状物的渐进性松动和股骨局部骨质溶解也显示假体的不稳定性。虽然股骨和多孔罩之间的致密联结已经被证实。骨的重吸收仍然经常地在邻近部位发生。因为远端的致密联结并不排除假体围绕靠近骨干远端的轴线摆动的可能性，这种称为“邻近压力遮盖”现象可被引起骨消溶的细微运动所解释。同样地，在一些非骨水泥

股骨假体中，局部骨端的骨质溶解也很可能是围绕靠近骨干近端轴线的细微运动的结果。

假体颈圈

假体颈圈在负载运送时对邻近骨干是否有利还在争论。

小 结

伦琴立体摄影图证明假体松动是早期假体不稳定性所致（因不充分的联锁装置或因脆弱的海绵状骨床使初期固定力量不够，或因为热损伤使骨层消溶引起固定缺失）。因此，所谓“后期松动”是因为后期才发现而不是在后期发生的松动。一些已经在流行病学研究中作为重要内容加以阐述的因素，如体重、生理活动、外翻或内翻位置、假体骨颈的长度等，可能在松动中仅仅是次要因素。最后，一些学者提出下列因素，包括对磨损碎屑的反应、金属过敏、压力遮盖及免疫反应等很可能是松动的重要原因。

骨折治愈过程中的骨Gla蛋白(BGP)

河北中医学院(050011) 因伟明译 赵建校

骨Gla蛋白(BGP)由成骨细胞合成，多作为与骨形相关的蛋白来研究。成骨细胞的产生尚不完全清楚，BGP的作用也不明确。笔者在实验中用大鼠的骨折模型，就骨折治愈过程中产生的骨新生过程的BGP出现和消退进行了研究。

用出生后7~8个月的雌性威斯特系大鼠（体重230~260g）70只，在麻醉下用手将小腿骨折，于骨折后1、2、4日，1、2、4、8周，麻醉下心脏采血处死。含周围肌肉的骨折标本用中性福尔马林固定，脱钙后制成石蜡切片，用HE染色及抗过氧化酶法进行免疫组织染色。用放射免疫测定血清BGP，用血清Ca、P、ALP、Lau法测定抗酒石酸盐酸性磷酸酶(TrACP)就其相互关系也进行了研究。

通过免疫组织染色，骨折后最初显示免疫反应的细胞是骨髓内的细胞，此细胞从出现到第2周以后开始减少，一直持续到第8周。另外，骨膜下也从初期起出现阳性细胞，4日~1周达峰值。第4日，在骨折端骨髓部的许多成纤维细胞中，可见抗BGP抗体阳

性表现。1周后，可见包围骨髓内软骨细胞及骨样的成骨细胞染色，其后为4~8周的骨小梁再造和染色阳性细胞减少。

血清BGP在骨折后4日开始减少，1周后示高值。将各群间的变化进行多种比较测定，4日和1、2、4、8周群之间有极显著性差异($P < 0.01$)。血清ALP1日和2日群，4日和1周群之间有显著性差异。血清BGP值上升反映了免疫染色获得阳性细胞量的增加。骨吸收参数TrACP 1日和4周的峰值与ALP显示同样变化。

在骨新生过程，抗BGP抗体阳性细胞出现显著，表明与骨新生相关。骨髓中软骨细胞、成纤维细胞样细胞中也出现阳性反应，认为BGP染色是检测间叶系细胞分化过程的有效方法。对于胶原遗传因子表现型变化的研究也有较高的利用价值。血清BGP值的上升比ALP慢，但是，跟组织学上旺盛的软骨细胞、骨样时期一致，可以认为血清BGP是特效的骨形成指标。

岩崎廉平：骨折治愈過程における Bone Gla Protein (BGP) 整形外科 41 (8): 1252, 1990