

消炎止痛祛瘀膏治疗闭合性软组织损伤

河北省保定市骨科医院 (071000) 张保华 翟永军 刘春增 刘根年 李和平

我院采用“消炎止痛祛瘀膏”外敷，治疗四肢闭合性软组织损伤124例，疗效满意。现报告如下。

临床资料：男性69例，女性55例；最大年龄70岁，最小9岁；损伤部位：均为闭合性损伤，其中膝关节17例，腕关节23例，踝关节82例，胫腓骨闭合性骨折1例，肱骨踝上闭合性骨折1例。

方剂组成及用法：土元 冰片 榆树皮 大黄 樟脑 三七 没药 红花 桃仁 水蛭 虻虫 牛角粉 牛苦胆等。

将上药研成细末，用水调成糊状。骨折病人先行手法复位后，局部外敷，3日换药一次，7日后肿胀减退即可停用。单纯软组织损伤患者，局部外敷，隔日换药一次，一般3次基本痊愈。

疗效评定标准及结果：优：外敷药后24小时疼痛减轻，肿胀明显消退，50例；良：外敷药后36小时疼痛减轻，肿胀明显消退，71例；可：症状有所改善，疼痛肿胀减轻在48小时以后，2例；差：症状稍有改善，疼痛肿胀减轻在50小时以后，1例。

骨盆骨折并股骨颈骨折漏诊1例

齐齐哈尔第一医院骨科 (161005) 陈德庆 卢喜奎

患者女，54岁。1990年3月27日11时被铁门砸伤，即送我院。检查：T37.3℃，P112次/分，R26次/分，BP11/8kPa，意识模糊，面色苍白，表情痛苦，四肢厥冷。心肺腹无异常。骨盆耻骨联合处肿胀，压痛明显，骨盆分离挤压试验阳性，尿液不能自动排出，给予留置导尿，排出尿液50ml，色正常。X线片示：双坐骨耻骨枝骨折。给予抗休克治疗，6小时后患者神志清晰，呼吸平稳，P86/次分，BP15/10kPa，尿量700ml，四肢末梢温暖。然后给予盆兜夹板固定骨盆仰卧位及促进骨折愈合药物。8周后下床活动，患者诉右髋疼痛，摄片见右股骨颈骨折移位明显。接着行右胫骨结节

牵引2周，在硬膜外麻醉下行人工股骨头置换术，切口一期愈合出院。

本例主要教训是：1. 此患者骨盆骨折X线显示十分明显，忽略了无移位的股骨颈骨折，被主要的显著损伤所掩盖，发生漏诊。2. 患者处于休克状态，无法合作，体检有一定困难，在休克纠正后也没有做周密系统检查，发生漏诊。3. 在住院期间还需定时进行细致的检查及观察，定期复查X线，无移位的股骨颈骨折在最初的X线片上可能难以判断，而一、二周后由于骨折部位骨质开始吸收，迹象终于显示出来，此患者住院8周下床后诉右髋痛时再摄片，才发现漏诊。

启 事

本部现存少量89、90、91、92年的《中国骨伤》。单行本每年7.20元，合订本90、91、92年每本16.80元；(以上含邮资)。欲购者，请速寄款至《中国骨伤》杂志编辑部钟方同志处邮购。