

## 活血疏肝汤在骨折早期的应用

河南省郑州市骨科医院 (450052) 赵永福

笔者运用平乐郭氏经验方活血疏肝汤治疗跌仆坠堕早期局部肿胀、疼痛等症,收到较好的效果,现介绍如下。

**方药组成:** 当归12g 柴胡12g 黄芩9g 赤芍10g 桃仁9g 红花9g 大黄10g 陈皮6g 枳壳9g 厚朴9g 甘草3g

使用时可根据临床表现、病之轻重、体质强弱、年龄大小而辨证施治。如身体强壮躯干受伤,瘀血在中焦,表现腹痛、腹胀、拒按、噁心、呕吐、大便不解等症,宜重用攻下逐瘀活血之大黄、桃仁、红花;若四肢受伤局部肿胀甚,重用桃仁、红花以消肿逐瘀;如肿胀甚,发热者,重用柴胡、黄芩,加茯苓、丹皮、公英、地丁以渗湿解毒。

**典型病例:** 王××,男,29岁,农民。汽车压伤右大腿1天,疼痛剧烈,不能站立,于1991年6月18日入院。检查:右大腿肿胀明显,压痛(+),拍X片示右股骨中段粉碎型骨折,移位明显并互相重叠。即给予股骨髁上骨牵引,内服活血疏肝汤加延胡索9g、乳香、没药各6g。3剂。肿胀、疼痛明显减轻。又服上方3剂,肿痛基本消失。局部小夹板固定,6周拍X片骨痂大量生长,去除牵引,2个月下床扶拐行走而治愈。

**体会:** 活血疏肝汤是郭氏治疗跌打损伤的代表方,它具有活血祛瘀、疏肝调气,通经活络、消肿止痛等功能,临床灵活应用,确能收到良好的结果。

## 腹膜后间皮肉瘤压迫坐骨神经误诊一例

浙江医科大学附属二院 (310009) 丁小安 陈健

朱×,女,42岁。住院号233769。左臀骶痛伴左下肢痛十年,加剧二年。患者十年前无明显诱因,开始出现左臀骶痛,咳嗽时疼痛稍加重,伴左小腿及足背痛。近二年逐渐加重。CT检查为“L<sub>4</sub>、L<sub>5</sub>、L<sub>5</sub>S<sub>1</sub>椎间盘膨出,L<sub>5</sub>S<sub>1</sub>椎间盘轻度突出。”院内外数家医院先后诊断为“左臀肌筋膜炎”、“梨状肌综合征”、“腰椎间盘突出症”、“盆腔炎”等,曾行多种方法保守治疗无效,故来我院诊治。入院诊断:“左臀肌筋膜炎”。

检查:腹软,无压痛及反跳痛,未及肿块。左臀区压痛,其中骶骨左外侧压痛敏感,向左下肢放射,“4”字试验阴性,直腿抬高试验左右70°,加强试验阴性。

入院后给予消炎止痛、抗菌及活血祛风通络等中西药物口服,并予针灸、推拿及局部封

闭,病情无减轻。入院十天后磁共振(MRI)检查:1.腰椎未见异常MRI征象,L<sub>5</sub>S<sub>1</sub>椎间盘有变性;2.盆腔内可见一个肿块,位于盆腔左后方,呈圆形,大小约5.4×5.5cm,境界轮廓清楚,与周围组织分界清楚,信号则为与肌肉相等,骶尾骨骨质未见改变。因此考虑为肿瘤压迫坐骨神经。

处理:全麻下左骶前肿块切除术。术中见腹膜后小骨盆左右侧壁外有一个4×4×6cm<sup>3</sup>的肿块,质中,有包膜,表面有二根较粗的神经(坐骨神经)通过。取肿物组织活检。病理报告:“(盆腔腹膜后)间皮肉瘤(低中度恶性)。”

讨论:1.引起臀腿痛的疾病较多,常见的有腰椎间盘突出、椎管狭窄、臀肌筋膜炎、梨状肌综合征及盆腔炎等,腹膜后肿瘤引起者相对较少见。首都医院统计100例腹膜后肿瘤,其