

线,作外侧方牵引,重量为 6~8kg,持续 3 周。外侧方牵引,亦可用宽 15cm 布带,内衬海绵,长度适宜,置于大腿根部,重量为 6kg,时间也为 3 周,本组 2 例采用该法,亦获满意效果。侧方牵引需搭床旁支架。

**治疗效果** 本组 8 例经牵引后,整复满意,去牵引后即作床上积极活动,半年始逐步负重。功能恢复除一例稍差外,均良好。

**讨论** 大多数中央型髋关节骨折脱位均可保守治疗获满意效果,而双向牵引为公认治疗该型脱位理想方法,符合受伤机制的反机制,较单用纵向牵引优越。

(收稿:1994-04-21)

## 慢性膝关节滑膜炎的治疗

浙江省丽水市医院(323000)

王济纬 王志荣 魏尧森 杨立峰  
陈献岳 张凯耀 周健 黄开贤

我们自 1991 年 1 月~1993 年 1 月对 40 例慢性膝关节滑膜炎患者分别用局部封闭及局部封闭加中药内服进行对比治疗,报告如下。

**临床资料** 本组 40 例计 46 个膝关节。男 17 例,女 23 例;左侧 21 膝,右侧 25 膝;年龄最大 72 岁,最小 22 岁;病程最短 2 个月,最长 2 年 7 个月。均有外伤或劳损病史。膝关节肿胀,沉重不适,屈伸不利,行走不便。疼痛不剧烈,局部无红热。膝眼饱满,触之囊性感,有压痛或浮髌试验阳性。关节穿刺为淡黄色液体或淡血性液体。X 线检查骨与关节无明显异常。

**治疗方法** 40 例随机分成两组。局封组 20 例 22 膝,局封加中药组 20 例,24 膝。

**局封:** 在无菌操作下抽出关节液,再注入 1% 普鲁卡因 4ml 和醋酸强的松龙 25mg 的混和液。每周一次,最少一次,最多 3 次。

**中药:** 用自拟伸筋合剂。方以伸筋草 30g 牛膝 30g 丹参 10g 归尾 10g 白芍 10g 木瓜 10g 制乳香 6g 制没药 6g 鸡血藤 30g 甘草 6g 的配比,制成瓶装合剂溶液。每天服用 3 次,每次 50ml。最短服用一周,最长服用 4 周。

**治疗结果** 疗效评定标准:治愈:患膝肿痛消失,功能活动正常,胜任原工作,随访 3 月无复发。显效:肿痛消失,活动基本正常,但劳累后仍有轻度疼痛,能坚持工作。有效:肿胀部位消失,疼痛减轻,关节活动轻度受限,劳累后症状加重。无效:自觉症状及功能活动无改善或加重。结果为局封组:治愈 9 个关节,显效 4,有效 7,无效 2,合计 22。局封加中药内服组分别为 16,6,

2 及 0,合计 24。

其疗效经统计分析,两组间有显著差异( $p < 0.05$ )。

**讨论** 慢性膝关节滑膜炎多为创伤或劳损引起,由误治失治迁延而成。中老年易患,女性多见。因损伤引起滑膜血管扩张,组织充血水肿,血细胞及胶原纤维渗出,关节内压力增高,氧分压下降,形成恶性循环。最终滑膜退变。脂肪化生。关节穿刺可降低关节内压力,排除关节液中毒性物质。醋酸强的松龙与普鲁卡因腔内注射,控制炎性渗出,促进渗出物的吸收,缓解疼痛。本证中医属痹症范围,为伤后经络瘀阻,气血不畅,更因气血虚弱,卫外功能不足而致风寒湿邪侵袭而为痹。伸筋合剂旨在活血祛瘀,消肿通络利关节。改善局部血液循环,促进代谢。局封加用中药内服提高了治疗效果,减少复发。

(收稿:1994-04-21)

## 压舌板治疗拇指骨折

山东省潍坊市人民医院(261000)

钟军 李相平 邢同云

笔者自 1991 年以来采用压舌板自制夹板治疗拇指骨折 30 例,介绍如下。

**制作方法** 取压舌板两块,在水中浸泡 10 分钟左右取出,根据病人足弓及足背的形状,用酒精灯将压舌板塑出适合的形状即可。

**治疗方法** 将塑形好的夹板,在患者足底面及背面放好,夹板要长出拇指末节约 2cm 左右,拇指稍有屈曲,然后用胶布条三条将拇指及患足做环形缠绕。注意不易过紧,最后用绷带将拇指及患足踝关节加以固定即可。

经夹板固定妥当后,嘱病人术后 2~3 天来院复查,检查固定情况及患趾的血运情况。如患趾血供受影响,可适当放松绷带以减少张力,必要时可放松固定的胶布条。术后每周检查一次。一般在术后 3~4 周即可临床愈合。去除固定,功能锻炼。

**体会** 利用压舌板自制小夹板,取材容易,简单易作,操作方便,可随意塑形,固定可靠,易于掌握。固定后病人即可下地活动,有利于骨折的愈合。该夹板适应拇指的解剖生理特点,符合生物力学原则,有简、便、廉的优越性,值得推广。凡拇指骨折,第一掌骨骨折均可应用。开放性骨折经创口清创处理后亦可采用此法治疗。

(收稿:1994-04-04)