

临床资料

本组 105 例中男 58 例，女 47 例；年龄：40~60 岁 74 例，61 岁以上 31 例；发病时间 3 月~8 年；有明显外伤史 35 例，长期低头伏案工作者 72 例，平素有高枕习惯者 51 例，不明原因者 9 例；X 线检查：颈椎生理曲度改变 89 例，后纵韧带钙化 45 例，椎间孔变窄、小关节突增生 97 例。

治疗方法

自拟加减木瓜汤：木瓜 10g 黄芪 15g 杭白芍 20g 羌独活各 10g 野桑枝 20g 徐长卿 12g 续断川断 12g 川牛膝 10g 川桂枝 6g 五加皮 10g 甘草 6g。疼痛甚者加豨莶草 10g 威灵仙 10g；X 线颈椎片和骨质增生重者加鹿角片 10g 骨碎补 10g 自然铜 10g。用法：每日一剂，水煎二次，其取汁 500ml，分二次口服，15 剂为一疗程。

治疗结果

按诸氏评定标准^[1]全部病例中，最快一个疗程即可消除症状及体征，最长 6 个疗程，平均 2.3 疗程。本组优 48 例，良 31 例，有效 19 例，无效 7 例，总有效率 93.3%。

讨论

颈椎病祖国医学归属于痹证范畴。由于感受风寒湿合而为痹，或劳损、或外伤、或姿势不良等原因引起颈部经络失常，或“筋出槽、骨错缝”而发病。表现为经俞不利，经络痹阻；或气血瘀滞等，而致颈肩背及上肢麻木酸痛等。自拟加减木瓜汤以祛风寒湿取治其标，补气养血治其本。本方集祛风舒筋，温通经脉，益气养血壮筋骨、缓急定痛，诸法合力，使风寒湿邪得祛，气血得充，筋脉得养，标本同治，缓急同施，扶正与祛邪并用，标本兼治，诸证得以消失，同时改善血液循环，增强组织代谢和营养，促进软组织、小关节炎性水肿吸收消散，松解粘连，解除对神经根的不良刺激和压迫，使颈椎的原有生理曲线得到恢复。在使用上方的同时，适当加手法治疗效果更好。

参考文献

1. 诸方受, 等. 药物颈枕治疗颈椎病 212 例疗效观察. 中医正骨 1994. 2 (6) 19.

(收稿: 1994-12-26)

阳和汤加味治疗小儿髋关节错缝 53 例

江西省南康县中医院 (341400) 李德权

笔者用阳和汤加味治疗小儿髋关节错缝取得了满意的效果，现就有资料记载的 53 例，报告如下。

一般资料

本组男 36 例，女 17 例；最大年龄 13 岁，最小 2 岁；病程在 3 个月者 1 例，2 个月者 1 例，其余均在发病 1~4 天就诊；发病均在单侧。

诊断要点

患儿有扭伤病史，或晨起突然发病。诉髋或膝关节内上疼痛，跛行，甚者不能直立行走。患者腹股沟可有肿胀压痛，患肢多呈外展外旋半屈曲位，少数可见骨盆倾斜，患肢假性变长，X 线未发现异常。排除髋关节结核、股骨头缺血性坏死、化脓性髋关节炎。少数患者伴有轻度发热。

治疗方法

以阳和汤为主加减水煎服，每日一剂。5 岁小孩用量为：鹿胶 5g 麻黄 3g 肉桂 3g 熟地 10g 白芍 6g 怀牛膝 6g 蕤苡仁 8g 威灵仙 6g 白芥子 8g 生

甘草 3g 木瓜 3g。舌尖红者加连翘 6g，伴轻度发热者再加金银花 6g、生地易熟地。

治疗结果

服药 1~3 剂痊愈 46 例，4~6 剂痊愈 6 例，1 例服药 12 剂症状无明显改善而未再就诊，总治愈率 98.1%，且在服药一剂后均有显著效果。

讨论

小儿由于发育尚未成熟，韧带和关节较为松弛，加之小孩扭跌伤的机会多，易引起关节滑膜、哈佛森腺，水肿及炎性反应而发生关节内圆韧带等组织的错缝或股骨头半脱位。笔者在治疗过程中均用阳和汤加味内服，而未采用手法复位及其他治疗，均取得了较好的疗效。随着水肿及炎性反应的消除，错缝之组织就能自行恢复，避免了手法复位患儿不合作或手法不当加重损伤。

(收稿: 1994-07-16)