

桂枝葛根汤加减治疗颈椎病 126 例

山东省济宁市中医院(272137) 侯庆忠 刘乃斌

自 1979 年 10 月～1995 年 4 月采用桂枝葛根汤加减治疗颈椎病 126 例，效果满意，现报告如下。

临床资料

本组 126 例中男 84 例，女 42 例；年龄 28～64 岁，神经根型 102 例，交感型 4 例，椎动脉型 6 例，脊髓型 2 例，混合型 12 例。

治疗方法

桂枝加葛根汤：桂枝 12g、赤芍 15g、甘草 10g、生姜 10g、大枣 15g、葛根 20g。神经根型加灵仙 12g、姜黄 15g、当归 15g、防己 12g、木瓜 12g；交感型加浮小麦 30g、生黄芪 6g、麻黄根 12g；椎动脉型加半夏 6g、陈皮 6g、天麻 12g、全虫 10g、钩藤 10g、川芎 15g、柴胡 12g；脊髓型加黄芪 15g、党参 12g、川芎 12g、当归 12g、地龙 15g；混合型视临床症状，酌情按上述分型情况加味调治。

上药每日一剂，水煎、温服。取微发汗，避风寒，休息，并配合领枕带颈椎牵引每日一次，每次 20 分钟，牵引重量 5～20kg，视病人耐受性随时调整。

治疗结果

疗效评定标准：优：临床症状体征消失，恢复原工作；良：临床症状体征大部分消失，颈部时有不适感，但不影响工作与生活；可：临床症状体征有明显改善，每遇气候变化感受寒凉易诱发，颈及上肢不适；差：临床症状体征无改善。本组 126 例临床疗效优 58 例，良 46 例，可 20 例，差 2 例。一般治疗 3 天有明显疗效。疗程最短者 2 周，最长者 6 周。以神经根型疗效最好，2 例疗效差者，1 例椎动脉型经高压氧治疗后缓解，1 例脊髓型经后路椎管扩大成形术治愈。

讨 论

桂枝加葛根汤原出自汉·张仲景《伤寒杂病论》用以治疗“太阳病、项背强几几，反汗出恶风者”，其病机为风寒之邪客于太阳经脉之间，经络不舒，阻滞气血津液运行，经脉失养。桂枝汤辛散温通，解肌表调营卫，葛根解肌发表生津舒筋，散经输之邪，解项背拘急，温服取微发汗以促进其解肌表、和营卫，活血通络之功，从而缓解以致消除颈椎病的临床症状。

(收稿：1995-07-21；修回：1996-01-18)

手法治疗幼儿髋扭伤

中国石油天然气总公司中心医院(廊坊 102849) 孟令凯

幼儿髋扭伤是骨科小儿常见病之一，具有单侧发病、发病急、病程短、影响活动等特点。笔者从 1987 年起在门诊工作时手法治疗 17 例，全部治愈，现总结如下：

临床资料 男性 14 例，女性 3 例，年龄最小者 2 岁，最大者 10 岁，右髋 13 例，左髋 4 例，病程最长者 1 月，最短者 3 天。

诊断依据 ①病程短，多有轻度外伤史，部分患儿记述不清；②单侧髋部疼痛或有轻度痛感，行走跛行，髋部活动略受限。③髋部无肿胀，髋关节前侧压痛阳性，髋关节活动外展略受限，患肢假性延长 1～2cm。④X 线表现无异常。⑤须与髋关节结核、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、股骨头缺血性坏死等疾病相鉴别。

治疗方法 患儿仰卧，双下肢伸直放松，医者站于

患侧，一手握住踝部，使患肢屈膝屈髋，另一手拇指顶在后侧的股骨近端，做伸膝伸髋，使髋关节过度后伸，同时另一手拇指用力向上顶，此手法做 5～10 次，待测量双下肢等长后即可。

体会 ①幼儿髋扭伤其名称尚无定论，有的认为因外感引起的髋关节暂时性滑膜炎。有的认为是外伤所致的外伤性滑膜炎。笔者认为幼儿髋部肌腱、关节囊发育不健全，髋关节间隙较宽，髋关节周围组织松弛，即使是很轻微的外伤，也可导致髋扭伤，出现股圆韧带及髋关节滑膜嵌顿绞索现象。本手法治疗幼儿髋扭伤，多在 1～2 次治愈，因幼儿发育不健全，故手法一定要轻柔，手法后三天内避免跑跳。

(收稿：1996-01-11)