

以上数据为求平均数及标准差 ( $\bar{X} \pm S$ )，然后进行

两组间数据的配对 t 检验。

表 3. 骨折后骨痂中骨矿密度比比较表 (%)。

天数 组别	15	25	35	45	55
实验组	2.12 ± 1.83 *	5.52 ± 3.19 △△	16.42 ± 6.55 △△△	18.10 ± 5.66 △△△	18.63 ± 6.24 △△
对照组	2.34 ± 1.75	3.10 ± 1.57	10.23 ± 5.86	14.32 ± 6.12	16.62 ± 5.72

表 4 骨折临床愈合时间表 (天,  $\bar{X} \pm S$ )

项目 组别	例数	临床愈合时间
实验组	50	46.0 ± 2.0 △△△
对照组	50	54.8 ± 2.6

### 讨 论

田异接骨冲剂骨折的早、中期有明显的消肿作用，肿胀消退时间早、快，证实了该药具有明显的止血、活血、消瘀作用，在止血基础上消瘀行滞，使气血流畅，促进损伤局部的代谢，减轻局部炎症反应，故有效地促进骨折创伤的修复。田七活血定痛，泽兰活血利水，无名异散肿痛，丹参、当归有明显促进消肿及骨折愈合作用。

本结果还显示田异接骨冲剂，能明显提高骨痂质量，使骨矿密度比高值出现时间早，与对照组比有非常

显著差异。证实该药方能促进骨痂矿物质沉积，增强成骨及破骨细胞的活性，从而有效加速骨折愈合的进程。我们认为，骨折愈合快固然与早期肿胀消除快有关，还与该方中黄芪补气健脾，当归补血和血，淮山健脾益胃，促进气血的供养，减轻骨折中后期的负氮平衡有关。另外，该方中还有川断、骨碎补、牛膝等补肾强筋壮骨，促进筋骨健强，对加速骨折愈合也起至关重要作用。

### 参考文献

- 全国中西医结合治疗骨折经验交流会，骨折疗效标准。天津医院骨科特刊（试刊号）1978；32。  
(本文部分骨矿含量微分析项目由中国人民解放军东方医院病理科帮助测定，特此致谢。)

(收稿：1995-10-06)

## 中药熏洗治疗足跟痛 120 例

山东济宁市中医院 (272137) 李诗杰 李书耀

笔者采用中药熏洗治疗足跟疼痛 120 例，疗效满意，现报告如下。

**临床资料** 120 例中男 68 例，女 52 例；年龄 12~82 岁；病程 4 天~482 天；跟骨增生 82 例，劳损 26 例，扭伤 12 例。

**治疗方法** 1. 组方组成：川芎 50g 鸡血藤 30g 苏木 50g 红花 20g 牛膝 20g 五加皮 20g 独活 20g 防风 20g 秦艽 20g 寻骨风 30g 小茴 40g 透骨草 20g 伸筋草 20g。

2. 用法：每剂药加水 2000ml，煎汤先熏后洗，将脚放入药水中浸泡，在熏洗中要适当的活动足关节。每天早晚各熏洗一次，每付洗药用 3 天后更换新药。一般 5~15 天病情大有好转。

**治疗结果** 足跟部疼痛消失，关节活动恢复正常，68 例；足跟部疼痛基本消失，关节活动有明显的改变 52 例。

**讨 论** 川芎、鸡血藤、苏木、红花、牛膝、活血行气、舒筋通络，祛瘀消肿止疼；五加皮、秦艽、寻骨风、透骨草、防风、小茴、伸筋草、有祛风除湿，散寒之功，舒松皮筋之效；能使关节活动之能，诸药合用，能活血化瘀，消肿止疼，舒肌筋通血脉，并能祛风除湿，对增生之关节有抑制增生作用，使关节功能正常。中药熏洗疗法使用广泛，简便易行，疗效满意，但仅能改善症状而不能化掉增生之骨赘。熏洗时注意药水温度以防止烫伤。

(收稿：1996-03-04)