

· 药物与方剂 ·

分型辨证治疗脑外伤综合征 48 例

浙江省温州市华侨伤骨科医院 (325027)

王步煊

作者自 1993~1997 年,以通窍活血汤加减治疗脑外伤综合征 48 例,效果满意,现介绍如下。

临床资料

48 例中男 32 例,女 16 例;年龄 14~56 岁,就诊时间:伤后 7~180 天。临床表现:头痛眩晕,泛泛欲吐,健忘多梦,心神不宁,精神萎靡,四肢疲倦无力及性情改变等症状。舌质紫暗,苔薄黄,脉沉涩。

治疗方法

1. 基本方:葛根 15g,丹参 15g,白芷 5g,川芎 5g,石决明 30g,天麻 12g,黄芪 15g,党参 20g,元胡 6g。

2. 用法:每日一剂,每剂煎二次,早晚各服一次,可根据患者年龄大小及体质强弱,适当增减药量,并按辨证分型及随症加减:(1)瘀血内阻型:治宜活血通窍,清化瘀浊之法,在基本方中加桃仁 6g,红花 3g,木香 6g。(2)肝阳上亢型:治宜养阴清肝,育阴潜阳法,在基本方中加地龙 9g,羚羊角 1g。(3)气血不足型:治宜补气养血,益智生髓。在基本方中加熟地 20g,当归 12g,白术 12g。(4)肝肾亏虚型:治宜滋肾平肝,益智安神。偏阴虚者在基本方中加杞子 20g,西洋参 10g,枣仁 10g。偏阳虚者,宜补肾壮阳,祛瘀生新,在基本方中加巴戟天 10g,川杜仲 10g。

治疗结果

疗效标准:优:症状消失,停药三年无复发。良:症

状消失,偶有复发,服药后症状消失。可:症状基本消失,遇劳复发。差:症状无改变。本组 48 例中,优 28 例,良 17 例,可 2 例,差 1 例,优良率达 93.8%。

讨论

脑外伤综合征属中医伤科中的内伤范畴。其病机为头部直接暴力所致或脑组织受到惯性冲击力而受伤。根据中医理论,按病情辨证归纳为四型。瘀血内阻型多见于损伤初期,因伤后气机运行不畅,瘀血阻积脑络清窍蒙闭所致;肝阳上亢型多见于损伤初、中期,因伤后忧怒过度,肝气郁结,或损伤血瘀,内耗肝阴,阴阳失调所致;气血不足型多因伤后失血过多,气血亏耗,心失濡养,心神不宁所致;肝肾亏虚型多见于损伤后期,因败血归肝,且久病伤肾,故肝肾亏虚。

《医宗金鉴》:“头为诸阳之首,位居至高,内涵脑髓,脑为元神之府,以统全体者也。”头部损伤后,清阳不升,浊阴不降,气机不畅,瘀血阻于脑络,则气血失调,濡养阻滞。本方重用葛根有显著的舒筋畅脉,调气和血作用,用治各种头痛;结合党参、黄芪,补气升阳,以助血行而通络止痛;配合丹参、川芎、元胡,活血化瘀;天麻、石决明镇惊安神;羌活、白芷有祛风止痛的功效;达到化瘀生新,健脑生髓,清利空窍,滋养肝肾,共奏良效。

(收稿:1997-08-21)

中西医结合治疗重度褥疮疗效观察

浙江省余姚市中医院 (315400)

刘蓉蓉 仇 洪

我们采用自制紫草膏纱条外敷,配合氯霉素粉剂、频谱治疗仪照射等方法治疗 III、IV 度褥疮 12 例,取得满意效果,现报道如下。

临床资料

12 例均由院外带褥疮入院,其中男 4 例,女 8 例;

年龄 48~83 岁;患褥疮时间为 6~45 天。褥疮部位及分度:III 度褥疮 8 例,19 处创面,分布在枕骨结节 1 处,肩胛部 2 处,背脊部 4 处,臀部 6 处,尾骶部 4 处,足跟部 2 处,创面直径在 3~5cm 之间;IV 度褥疮 4 例,4 处创面,都在尾骶部,创面直径 3.5~6cm 之间。